

Betegfogadási higiénés eljárásrend SARS-CoV-2 okozta fertőzések elkerülése érdekében

A járóbeteg szakellátási tevékenység folytatása mellett (23. hullám)

I. A betegbeáramlás szűrése: kikérdezés

1. Járóbeteg szakellátás tekintetében (Podmaniczky u)

- Egyéni védőeszközök további viselésének elrendelése a betegfelvételi iroda és a triage-t végző munkatársak számára.
- Egyéni védőeszközök biztosítása és kiosztása a betegellátásban résztvevő munkavállalók számára a VNK 2020. április 9.-n kiadott egyéni védőeszköz és munkaruha juttatási szabályzata alapján
- Kijelölt dohányzóhely használatának korlátozása.
- Oldalsó bejárat megnyitása személyzet részére.
- Fertőző beteg bejárat készenlétként tartása.
 - Ortopédiai rendelő megszüntetése, elkülönített rendelőként működik COVID gyanús, esetleg COVID-19 pozitív eset ellátása esetén
 - Elkülönítő (fertőző bejárat) kulcsának elhelyezése a betegfelvételi irodán
- Egység csomagolt védőfelszerelés hozzáféréseinek biztosítása – betegfelvétel
- Betegfelvételi kezd 6:45
- A szélfogóban annyi személy várakozhat csak, ami során minden irányban a szociális távolságtartás biztosítható (2 méter), a többiek előtte, az épületen kívül, egymástól 2 m távolságot tartva. Erre az intézet munkatársai figyelmeztetik is az érkezőket, illetve a padlón jelzéseket helyeznek el, plakátokon hívják fel a betegek figyelmét.
- Betegforgalom terelése
 - A bejáratban triage asszisztensek állnak
 - A főbejárat ajtó előtti paravánok kihelyezése, és figyelmeztető tábla hívja fel a figyelmet, hogy a betegellátásra érkező páciensek a betegfelvételen kötelesek megjelenni. A betegek csak kikérdezés és fertőzöttség szempontjából nem gyanús állapotuk megállapítása nyomán kereshetik fel a célrendelőt.
 - A rendelőbe csak az orrt és szájat eltakaró maszkban lehet belépni. Erre a betegek figyelmét fel kell hívni. Ha a betegnek nincs, a triage-t végző munkatárs ad egyszer használatos papír szájmaszkot.
 - Minden rendelőbe belépő betegnek alkoholos kézfertőtlenítést kell végezni.
 - Minden vizsgálatra jelentkező beteg és munkavállaló, a VE VIP Center kivételével jelentkezik a betegfelvételi irodában.
 - A betegfelvételi munkatársai, asszisztensek szükség esetén, egyedi beosztással segítik ezt a folyamatot. Ez a munkatárs lesz felelős a gyanús

esetek elkísérésére. Nála van az elkülönítő kulcsa is, és rendelkezik FFP maszkkal, ill. az eljárásrendnek megfelelő védőfelszereléssel.

o LABOR?

- A főbejárat ellenőrzést megkerülő páciens kikérdezése és maszkkal való ellátása, az adott szakrendelésen történik. Itt kerül eldöntésre a további ellátása.
- Triage-t távkonzilium formájában támogató orvosok kijelölése és biztosított a betegbelépési ponton.
- Jó időben a bejárat ajtó nyitva tartandó.
- A rendelésekre egyszerre csak annyi fő engedhető fel, ahány személlyel a szociális távolságtartás (1,5 méter) megtartható. Ennek ellenőrzése a szakrendelések feladata, amennyiben a várakozók létszáma meghaladja a fenti feltételt, az orvos vagy asszisztens telefonáljon le a triage munkatársaknak, hogy egyelőre több beteget ne engedjenek fel. Ha a triage-t végző munkatársak tudják követni a szakrendelés betegforgalmát, a betegáramlást maguk is korlátozhatják.

Triage-t végző munkatársak számára biztosítandó védőeszközök:

- sebészeti szájmazsk,
- egyszer használatos gumikesztyű (gyanús eset kapcsán kell csak felvenni, egyébként nem jelent védelmet)
- egyszer/többször használatos, lehetőleg hosszú ujjú kötény.

Betegfelvétel munkatársai számára biztosított védőeszközök:

- sebészeti szájmazsk,
- egyszer használatos gumikesztyű.

Gyanús betegek kiemelése (kérdések, betegfelvétel)

A triage-t végző munkatársak kikérdezik az érkező beteget koronavírus gyanúra és megméri az érkező beteg hőmérsékletét. Gyanús esetnek minősül minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok, vagy akinél az orvos COVID-19 fertőzés fennállását gyanítja.

Koronavírus gyanúra az alábbi feltételek megléte szükséges:

A.) Két tünet az alábbiak közül (klinikai kritérium):

köhögés;

nehézlégzés;

láz;

hirtelen kezdetű szaglászvesztés, ízézés hiánya vagy ízézés zavara;

aspecifikus tünetek, mint fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

ÉS

B.) A tünetek kezdetét megelőző 14 napban **szoros kapcsolatban** volt COVID-19 fertőzött személlyel, vagy

- a tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan bentlakásos szociális/egészségügyi **intézmény** lakója vagy dolgozója volt, ahol az új koronavírus szempontjából veszélyeztetett személyeket gondoznak és az intézményben igazolt COVID-19 járvány zajlik.

C.) COVID-19 fertőzésre jellemző radiológiai eltérés áll fenn

D.) SARS-CoV-2 nukleinsav kimutatása klinikai mintában;

vagy SARS-CoV-2 antigén kimutatása mintában.

Amennyiben az ellátásra érkező beteg koronavírus gyanúja felmerül, a beteget haladéktalanul az elkülönítőbe kell kísélni. A beteg további vizsgálata és ellátása csak ott történhet meg.

A rendelőintézetben megjelent SARS-CoV-2 fertőzésre gyanús betegnél kötelezően PCR vagy SARS CoV-2 Ag vizsgálatot kell végezni. PCR teszt folyamata külön eljárásrendben található. PCR vizsgálat elvégzése kötelező abban az esetben, ha a klinikai tünetek közül egy fennáll, illetve a beteg

- a.) tünetek megjelenését megelőző 14 napban olyan országban volt, ahol Covid-19 fertőződés van (járvány, közösségi terjedés), vagy
- b.) tünetek megjelenését megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt Covid-19 fertőzésre valószínűsítetten vagy megerősítetten fertőzött személlyel, vagy
- c.) járóbeteg/fekvőbeteg szakellátásra szorul, vagy
- d.) betegellátásban közvetlenül résztvevő egészségügyi dolgozó, vagy
- e.) bentlakásos/szociális intézmény lakója/dolgozója.

Klinikai tünetekkel érkező beteg a rendelőintézet területére csak abban az esetben léphet, ha beutalóján, vagy külön dokumentumon a háziorvos jelzi, hogy a kockázati szűrése megtörtént, annak eredménye negatív és a mintavétel a jelen tüneteket mutató megbetegedés alatt készült (friss)!

Szakrendelés tekintetében:

Ha az előszűrés ellenére koronavírus gyanúját állapítja meg a szakellátó orvos, a rendelést fel kell függesztenie,

- ha a beteg állapota azt kívánja, a betegnek mentőt kell hívnia,
- ha a beteg állapota az otthonában történő járványügyi zárlatot engedi, a betegtől PCR mintát kell levennie (a helyszínen), a fertőzésre gyanús vagy pozitív laboreredménnyel jelentkező személy adatait 24 órán belül jelenti az NNK OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerbe, továbbá a betegről tájékoztatja a közegészségügyi csoportot, akik jelentést tesznek a VI. kerületi Népegészségügyi osztálynak. szükséges adatok:
 - beteg neve, születési dátuma, lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma.
 - érintett munkavállalók neve, születési dátuma, lakcím/tartózkodási hely, telefonszám;
- az ellátó személyzet továbbiakban tájékoztatja a közegészségügyi csoportot a beteg épületen belüli mozgásáról (rtg, UH, stb.)

Az egészségügyi személyzet az esetlegesen kontakt várakozók adatai felveszi (név, születési dátum, a betegfelvétel biztosítja a többi adatot), és a betegeket - amennyiben lehet - más rendelésre irányítja, vagy új időpontot ad nekik. Az érintett beteget a továbbiakban NEM lehet egyéb vizsgálatra irányítani. Az épületen belüli mozgását ellenőrizni szükséges (kíséret).

Amennyiben a beteg nem minősül gyanúsnak, a beteget sebészeti maszkban a megfelelő szakrendelésre kell irányítani

- Az továbbengedett betegek figyelmét fel kell hívni, hogy ha legalább ketten tartózkodnak a szakrendelés előtt vagy a szakrendelés által érintett folyosón, legalább 1 méter távolságot tartsanak egymástól,
- A bejáratnál szemben található két „kisliftben” egyszerre csak egy fő utazhat.
- A lépcsőház melletti liftet is egyszerre csak egy fő - kivéve, akinek szükséges és betegkísérő személlyel érkezik - használhatja.
- Amennyiben a beteg gyanúsnak minősül:
 - szájmazskot kap, fel kell szólítani annak viselésére, aminek a használatát el is kell magyarázni.

Gyanús beteg esetén kötelező eljárások:

- A kijelölt munkatárs, ha a beteg a kikérdezés során felmerül a koronavírus gyanúja értesíti a kijelölt ügyeletes orvost, aki ismét kikérdezi a beteget, ha a beteg állapota sürgős ellátást igényel, az elkülönítőbe kíséri a beteget, tájékoztatja az érintett szakmát, vagy megkezdi az ellátást, közben a betegfelvétel értesíti a higiénit, aki elindítja a zárófertőtlenítés végrehajtását, kontaktokat felméri.
- Az ügyeletes orvos vagy az érintett szakma szakorvosa egyéni védelem mellett (egységcsomag a betegfelvételiben) a beteget lehető legrövidebb időn a lenti (volt ortopédia) rendelőben ismét alaposan és célirányosan kikérdezi és szükség esetén elsősegélynyújtásban, akut ellátásban részesíti. Amennyiben a beteget gyanúsnak ítéli, a fent leírtak alapján elvégzi a szükséges teendőket (PCR vizsgálat, jelentés 24 órán belül, MedWorks-n keresztül OSZIR rendszerbe). BNO kód: U0720.
- Ha biztonsággal kizárható a koronavírus megbetegedés gyanúja, a megfelelő szakrendelésre irányítja.
- Az elkülönített beteg mobiltelefon számát fel kell jegyezni, illetve meg kell adni a felvételi iroda mobilszámát, hogy az elkülönítés ideje alatt legyen lehetőség a kapcsolattartásra.
- Kórházi ellátást igénylő megbetegedett esetén az orvos egyeztet a két COVID-19 betegek ellátására kijelölt intézmények valamelyikével a fogadás szükségességéről és a rendelkezésre álló kapacitásról, majd hívja a mentőszolgálatot. (lásd beküldési rend, intranet)
- Az orvos a beteghez csak a számára biztosított védőfelszerelésben mehet be, lásd alul.
- Mindkét eljárási mód során a beteg távozását követően az érintett helyiségekben és a beteg által igénybe vett eszközökön záró fertőtlenítést kell végezni. Amennyiben

gyanús beteg mozgatása lifttel történt, a liftet fertőtlenítés megtörténteig használaton kívül kell helyezni.

SARS-CoV2 megbetegedés elleni védőoltásban részesült, SARS-CoV2 fertőzésre gyanús személyekkel kapcsolatosan szintén a fenti eljárásrendet kell követni függetlenül attól, hogy megkapta-e a teljes oltási sorozatot.

Amennyiben a kikérdezés során a beteg szoros kontaktnak minősül, de oltást kapott:

- ha csak az oltási sorozat első oltásában részesült, járványügyi megfigyelés alá helyezendő, az intézetet csak sürgős ellátás esetén látogathatja.
- ha mindkét oltással rendelkezik a személy és a védelem kialakulásának ideje is lejárt, a személy/beteg a vonatkozó előírásoknak megfelelően az intézményt látogathatja, amennyiben az oltottságot igazoló dokumentumot bemutatja.

formázott: Listaszerű bekezdés, Felsorolás + Szint: 1 +
Ígazítás: 0,63 cm + Behúzás: 1,27 cm

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman, 12 pt

Gyanús eset megjelenésekor azonnal értesítendő személyek:

Túri Veronika Rita higiénikus tel.: +36 30 239 78 40

Dr Zombory Ildikó orvosigazgató tel.: +36 30 200 08 86

Dr Pásztélyi Zsolt ügyvezető, tel.: +36 30 606 33 90

Budapest titkárság: tel.: 21-38 mellék

NNK Főváros és Pest Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Tel.:

Munkaidőben: +36 06 1 465 3850

Munkaidőn túl: +36 30 650 68 52

Egyéb feladatok a betegfelvételi iroda számára:

Az előjegyzett betegeket telefonon megkeresik, felhívják figyelmüket, hogy csak akkor jelentkezzenek ellátásra, amennyiben 14 napon belül nem találkoztak koronavírusos fertőző beteggel, nincsenek megbetegedésre utaló tüneteik és ellátásuk sürgető. Tervezett ellátások telefonos megkeresésre, megfelelő óvintézkedések mellett, kis számban tervezendők.

2. Fogászati ellátások tekintetében

Fogászati ellátás eljárásrendjét lásd külön utasításban.

3. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat tekintetében

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok eljárásrendjét lásd külön utasításban.

4. Szakrendelésenként bontva

A halasztható szakvizsgálatok és beavatkozások tekintetében a szakorvosok döntenek egyéni elbírálás alapján a vizsgálat ill. beavatkozás elvégzésének szükségességéről.

4.1. Tüdőgyógyászat tekintetében

A Tüdőgyógyászatra érkező betegeket csak orvosi vizsgálat után lehet rtg vizsgálatra küldeni. Mellkasröntgen vizsgálat a COVID-19 diagnosztizálására az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által kiadott eljárásrend alapján nem javasolt. COVID gyanús beteg röntgenvizsgálata szigorúan TILOS.

A tüdőgyógyászat munkatársai tekintetében minden beteg ellátásánál kötelező az egyéni védőeszközök készenlétben tartása, és annak viselése (orvosi szájmaszk/FFP2 respirátor, gumikesztyű, védőszemüveg, védőköpeny), amennyiben a beteg kikérdezés során gyanúsnak minősül. Spirometriás vizsgálat csak negatív PCR teszt eredménye esetén végezhető.

:

4.2. Fül-orr-gégészeti szakellátás tekintetében:

Minden beteg ellátásánál kötelező az egyéni védőeszközök készenlétben tartása, és annak viselése (orvosi szájmaszk/FFP2 respirátor, gumikesztyű, védőszemüveg/védőpajzs, védőköpeny), amennyiben a beteg kikérdezés során gyanúsnak minősül.

- Coronavírus gyanús beteg ellátása csak sürgős esetben végezhető, egyéb nem halasztható esetben PCR vizsgálat után kerülhet sor az ellátásra.
- Nem koronavírussal gyanús beteg esetén is az orvos/asszisztens nagyfokú veszélyeztetettsége miatt a vizsgálatokat FFP2 vagy FFP 3 maszkban, védőszemüvegben, nyakig zárt, hosszúujjú köpenyben, egyszer használatos gumikesztyűben kell végezni. Mivel a vírus az oronazális régiót kolonizálja, ha nincs kifejezetten gége panasz, a vizsgálat során a laringoszkópiától el lehet tekinteni. Az egyéb oronazális endoszkópos vizsgálatokat is a legszükségesebb minimumra kell szorítani.
- Fül-orr-gégészeti orr-garat vizsgálat 1%-os hidrogén-peroxidos öblítést követően történhet.

4.3. VE Medical Center tekintetében

A VIP Medical Centerbe érkezők, csak negatív fertőzöttségre irányuló kikérdezés és hőmérsékletmérés után kereshetik fel a Központot.

A VE Medical Center várójában csupán annyi beteg/kliens tartózkodhat egyszerre, amivel a szociális távolságtartás előírásai biztosíthatók.

A vizsgálatot követően a rendelőt át kell szellőztetni.

Az audiológiai vizsgálatokat a hely adottsága miatt 15 perc alá kell korlátozni, a beteg/kliens és a szakasszisztens a teljes vizsgálat alatt szájmaszkot köteles viselni.

Az olyan vizsgálatokat, amik meghaladják a 15 percet, 15 percnként meg kell szakítani, az egészségügyi személyzetnek a helyiséget át kell szellőztetni, erre az időre a helyiséget elhagyni, majd a vizsgálatot folytatni.

Ha a vizsgálat nem megszakítható (pl. terhelés), a beteg/kliens és egészségügyi személyzet között legalább két méter távolságot kell biztosítani, illetve sebészeti szájmaszkot kell adni.

Az irányító pultban egyszerre csak két egészségügyi operátor tartózkodhat.

A váróban nem tartható újság, reprezentációs anyag, utóbbit minden kliensnek egyenként, külön-külön kell átadni. A váróban előtalálható egyéb tárgyakat - mint például pohár - , minimalizálni szükséges.

4.4. Radiológia tekintetében

Ultrahang tekintetében sürgős esetnek minősülnek az alábbi kórképek, például:

Radiológiai UH vizsgálatok, felületes biopszia (nyirokcsomó, pajzsmirigy) megfelelő védelem mellett (szájmaszk viselése, beteg és ellátó) végezhető. Fontos, hogy a vizsgálatot igyekezzenek 15 perc alatt lebonyolítani. Hosszabb vizsgálat esetén a vizsgálatot meg kell szakítani, a helyiséget átszellőztetni. A folyamatos légszerűt minden esetben biztosítani kell. Egyszer használatos köpeny nem indokolt

4.5. Szemészet tekintetében

Szemészeti vizsgálat koronavírus gyanús beteg esetén csak abban az esetben végezhető, amennyiben a beteg állapota azonnali vizsgálatot igényel. A COVID-19 cseppfertőzés útján kötőhártya-gyulladást okoz, optalmológiai eltérései az allergiás conjunctiva irritációhoz hasonlítanak. Koronavírus fertőzésre gyanús akut beteg vizsgálata esetén az orvos/asszisztens teljes védőfelszerelésben végezze a vizsgálatot.

- FFP2 maszk;
- védőruha;
- védőszemüveg;
- kesztyű.

Nem koronavírusra gyanús beteg vizsgálatokor az orvos/asszisztens viseljen sebészeti szájmaszkot és gumikesztyűt. A vizsgálat során a betegre szájmaszkot adjunk.

Egyéb előírások:

- Non kontakt tonométer használatának mellőzése, helyette applanatis tonometer vagy Tonopen használható.

4.6. Infúziós ellátások:

- infúziós ellátást csak koronavírusra nem gyanúsnak minősített beteg kaphat;
- az ellátást úgy kell szervezni, hogy a betegek közötti 1,5 méteres szociális távolság megtartható legyen;
- az ellátás egész időtartama alatt a betegnek kötelező szájmaszk viselése;
- a helyiség légszerűjét folyamatosan biztosítani kell;
- a kezelést követően az infekciókontroll szabályainak megfelelően kell eljárni.

4.7. Fizioterápiás ellátások

- A beteg előjegyzése kezelésre csak telefonon keresztül történhet és csak Covidra nem gyanús beteg ellátása folytatható.
- Amennyiben a beteg rendelésen jár, az orvosnak/asszisztensnek kell át telefonálnia időpontkérés miatt.
- A betegnek és az asszisztensnek is szájmaszkot kell viselnie a kezelés ideje alatt.
- Szájmaszk levétele akkor sem megengedhető, ha a beteg egyedül tartózkodik a fiúlkében.
- A betegek érkezése és távozása csak úgy történhet, hogy egymás útvonalát ne keresztezzék.

- Minden kezelést követően fertőtlenítést kell végezni, a folyamatos szellőztetést biztosítani.
- Az eszközök kezelést követő fertőtlenítésében a VNK Infekciókontroll kézikönyvében foglaltak szerint kell eljárni.

4.8. Gyógytorna

Gyógytorna kezelés csak előzetesen kikérdezett, Covid-19 gyanúra negatív beteg esetén végezhető.

Gyógytorna kezelés csak telefonos időpont egyeztetést követően végezhető.

A betegek ne keresztezzék egymást: előbb a következő belép a terembe, majd az előző kilép.

A gyógytorna kezelés során a betegnek és a terapeutának is szájmaszkot kell viselnie.

Gyógytorna csoportos kezelés csak a távolságtartás betartásával folytatható.

A kezelés során a folyamatos szellőztetést biztosítani kell.

A kezelés során használt eszközöket a kezelés végeztével fertőtleníteni kell.

Két kezelés között átszellőztetés szükséges.

4.9. Sebészeti beavatkozások (kisműtétek)

Sebészeti beavatkozás csak úgy végezhető, hogy biztosított a beavatkozás teljes időtartama alatt a beteg és személyzet fizikai védelme, azaz a szájból, légutakból kijutó aeroszol cseppek ellen, illetve a beavatkozás az előkészítéssel együtt nem haladja meg a 15 perces időtartamot. A fizikai védelem megoldható sebészeti szájmaszkkal vagy izolációs kendő használatával (pl. Foliodripe), utóbbi elsődlegesen az arc, nyak területen történő sebészeti beavatkozások esetén alkalmazandó.

Olyan esetben, amikor a beteg Covid-19 gyanús,—PCR vizsgálat elvégzése szükséges. Amennyiben a beteg járványügyi státusza nem meghatározható, a további vizsgálat és beavatkozás eldöntésének tekintetében a kezelő orvos tájékoztassa felettesét (orvosigazgató), aki dönt a további teendőkről. Az egészségügyi személyzet számára és a helyiség infektókontrollal kapcsolatos teendőire továbbra is a műtéti higiénés előírások irányadók.

4.10. Magas kockázatú ellátások

Az alább felsorolt magas kockázatú ellátások elvégzéséhez az egészségügyi személyzetnek teljes védőfelszerelést szükséges biztosítani:

- aeroszol képződéssel járó beavatkozások;
- orr-garat vizsgálat;
- bronchoszkópos vizsgálat;
- endoszkópos beavatkozások

4.11. Gyermekgyógyászat

A gyermekgyógyászatot ellátást végző szakdolgozók a gyermekek vizsgálata és ellátása során az alábbi védőeszközöket kötelesek viselni:

- orvos tekintetében FFP légzésvédő és arcvédő plexi

-szakasszisztens tekintetében FFP légzésvédő.
 -amennyiben személyes kontaktust igénylő ellátás nem történik, tehát adminisztráció történik vagy telemedicina keretében folyik az ellátás, elegendő sebészeti szájmászk viselése.

4.12. Gazdasági munkavállalók és management tekintetében):

Az érintett munkavállalóknak folyamatosan biztosítani szükséges az alkoholos kézfertőtlenítőt vagy Clinell törlőkendőt, sebészeti szájmászkot, sárga színű veszélyes-hulladék gyűjtő badella zsákokot. A használt törlőkendőt/maszkot veszélyes hulladékként kell kezelni, a sárga színű zsákban gyűjteni, annak szállításig történő elhelyezése a Podmaniczky utcai telephelyen történik.

A közös használatú irodák tekintetében törekedni kell a szociális buborékok kialakítására, az egy irodát használó munkavállalók, amennyiben munkavégzésük során, egymás jelenlétében nem viselnek szájat és orrot eltakaró maszkot, más személyekkel történő megbeszélése során kötelezően vegyék fel (átmennek másik helyiségbe, vagy hozzájuk érkeznek).

4.14. Szociális helyiségek használata munkavállalók részéről

Étkező

Az étkezőkben egyszerre csak annyi személy tartózkodhat, hogy a szociális távolságtartás megtartható legyen (2 m)

II. Egyéb

Egyéni védelemmel kapcsolatos eljárásrend

Védőfelszerelés biztosítása, felelős gazdasági

Védőfelszerelés használatának oktatása, felelős közeg. csoport, fogl. eü.

Védőfelszerelés lista:

EP (ellenőrző pont)

- sebészeti szájmászk,
- gumikesztyű

Általános elvárás rendelőkben, irodákban.

Íróasztalok letisztítása, a nem szükséges tárgyak elrakodása

A rendelőkben, irodákban élelmiszer nem tartható, étkezés nem folyhat.

Egyéb előírás:

- haj összekötése
- ékszer viselés tilalma

Gyanús, tünetes eset orvosi ellátása, vizsgálata esetén használatos védőfelszerelés:

- Elkülönítőben történő ellátás

- FFP2 respirátor,
- gumikesztyű
- plexi arcvédő maszk
- csuklyás overáll

Közegészségügyi csoport feladatai:

Eljárásrend figyelemmel kísérése: közeg. csoport

Munkavállalók oktatása, felelős: közeg. csoport.

Mentesítés oktatása: közeg. csoport.

Elkülönítő rendelő felszerelése

- alkoholos kézfertőtlenítő
- folyékony szappan
- papír kéztörölő
- felületfertőtlenítő törlőkendő
- mosdóba kis tekercses WC papír biztosítása
- papírlapedő
- szemetes
- veszélyeshulladék gyűjtő zsák, gyorskötöző
- tűgyűjtő
- telefon/nővérhívó
- infúziós /injekciós ellátáshoz eszközök
- Bacillol tissue fertőtlenítő spray
- Clinell fertőtlenítő kendő
- szakmánként alapellátást biztosító, lehetőleg egyszer használatos eszközök

Mentesítés

Védőfelszerelés mentesítéséhez:

overál, gumikesztyű: egyszer használatos veszélyes hulladék.

arcvédő: Clinell fertőtlenítő

FFP2 maszk: Clinell fertőtlenítő

Gyanús eset esetén követendő eljárásrend

A gyanús esetet a kijelölt elkülönítőben kell elhelyezni. A középsúlyos, súlyos és kritikus állapotú szállítható betegeket az Országos Mentőszolgálat szállítja. Kijelölt COVID ellátók:

Az NNK mindig aktualizált eljárásrendje szerint.

A betegek elhelyezésével kapcsolatosan a fenti telefonszámokon szükséges egyeztetni a kijelölt intézményekkel.

Továbbiakban mentő értesítése amennyiben nem „önjáró”. Az elkülönítőbe csak az arra kijelölt személy a számára biztosított védőfelszerelésben léphet be a fertőző beteg számára nyitott utcára nyíló ajtón.

Teendők gyanús eset ellátását követően:

- A helyiséget záró fertőtlenítéssel ki kell takarítani. A keletkezett veszélyes hulladékot elkülönítve, dupla zsákban veszélyes-hulladék gyűjtő helyre vinni.
- Személyzet mentesítése fertőtlenítő oldattal parkolóban.
- Teendő munkaidőn túli elkülönítés esetére:
- A műszakban kijelölt egy asszisztens és portaszolgálat a mentő megérkezéséig az intézményben marad, a fertőtlenítő takarítást a kijelölt asszisztens végzi. Az EK védőruházat mentesítése, amennyiben felhasználásra került ebben az esetben nem történik meg. Veszélyes hulladékként kell kezelni.

Oktatásra szoruló személyek:

- Asszisztensek
- Orvosok
- Takarítók
- Porta személyzete
- Karbantartók
- titkárság személyzet

Oktatási témakörök

- Védőeszköz használat
- Mentés
- Takarítás
- Izoláció szabályai

Amennyiben az eljárásrend másképp nem rendelkezik a betegellátás során valamennyi munkatársnak sebészi-, a betegnek az épületben tartózkodás során szájmaszk viselése. A beteg a szájmaszkot csak indokolt esetben, vizsgálat céljából a lehető legrövidebb ideig veheti le.

Teendők munkavállalók megbetegedése vagy szoros kontaktnak minősített munkavállaló esetén

Az a munkavállaló, aki influenza szerű tüneteket észlel magán, a munkát nem veheti fel. A munkavállalónak otthonában kell maradnia és telefonon tájékoztatni háziorvosát.

Szoros kontaktnak minősített tünetmentes munkavállaló 10 napos járványügyi megfigyelésre izolációra kerül. Két SARS-CoV-2 PCR vizsgálatot követően állhat munkába. Az első mintavételre a járványügyi megfigyelés kezdetekor, illetve az utolsó kontaktot követő 10. napot követően kerülhet sor. (Foglalkozási megbetegedés kizárása/bizonyítása.) Lásd még 09.21. NNK eljárásrend.

Az egészségügyi ellátásban dolgozó kérheti a karantén megszüntetését az utolsó kontaktot követő 4. és 6. napon elvégzett negatív PCR teszt birtokában, de ezektől függetlenül kötelező a PCR vizsgálat elvégzése a 10 napon is, ebben az esetben tehát négy db PCR vizsgálat elvégzése történik.

Nem közvetlenül a betegellátásban foglalkoztatott, szoros kontaktnak minősített munkavállaló a karantén megszüntetését kérvényezheti az utolsó kontaktust követő 4. és 6. napon elvégzett negatív PCR teszt birtokában.

Ha az egészségügyi dolgozó klinikailag gyógyult, vagy COVID-19 fertőzése tünetmentesen zajlott, akkor munkavégzéséhez történő visszatérés feltétele egy SARS-CoV-2 Ag kimutatásra szolgáló gyors teszt vizsgálat negatív eredménye, ami levétele nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 7. nap!

21. napon 2 negatív eredmény nélkül is feloldható a foglalkozástól való eltiltás.

SARS-CoV2 megbetegedés elleni védőoltásban részesült munkavállaló esetén:

Függetlenül az oltási sorozat teljességétől, amennyiben a munkavállalónál SARS-CoV2 fertőzés gyanúja merül fel, a munkát csak negatív PCR teszt birtokában folytathatja.

Ha a munkavállalónál szoros kontakt esete merül fel:

- ha az oltási sorozatból csak az első oltást kapott meg, munkavégzés alól mentesíteni kell, járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, annak feloldása csak a fent leírtak alapján kivitelezhető;
- ha a szoros kontaktnak minősülő személy a teljes oltási sorozatot megkapta és az utolsó oltást követően, az utolsó feltételezett expozíció idejében a védettség az oltás ajánlása szerint kialakult, munkát végezhet a vonatkozó előírásoknak megfelelően, amennyiben az oltást igazoló dokumentumot bemutatja.

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Listaszerű bekezdés, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 0,63 cm + Behúzás: 1,27 cm

formázott: Listaszerű bekezdés


formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman, 12 pt

formázott: Listaszerű bekezdés, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 0,63 cm + Behúzás: 1,27 cm


formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman, 12 pt

Egészségügyi intézményben történő közösségi terjedést azonnal jelenteni kell!

|



Betegútvonal



formázott: Betűtípus: 7 pt