

Tájékoztató a koronavírus elleni védőoltás felvételének ellenjavallataival kapcsolatban

A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII.29.) Korm. rendelet a mentességgel kapcsolatban a következőt írja elő:

“(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.

(5) Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére, a házi orvosának javaslata alapján a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott (1) vagy (2) bekezdés szerinti jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségügyi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos adja ki.”

Táblázatos formában mutatjuk be azt, hogy a Magyarországon alkalmazott koronavírus elleni vakcináknál mik az ellenjavallatok, vagyis azok az állapotok/betegségek, amelyek fennállása esetén egy adott vakcina nem adható be.

A PFIZER és MODERNA oltóanyagainál csak a készítmény „hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység” szerepel az ellenjavallatok listáján. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a múltban anafilaxiás reakciót mutatott valamelyik hatóanyaggal vagy segédanyaggal szemben, ami ezekben az oltásokban szerepel, akkor az adott oltás nem adható be.

Az első oltás felvétele előtt senki nem találkozhatott még mRNS alapú hatóanyaggal, hiszen ilyen korábban nem alkalmaztak, vagyis a hatóanyaggal szembeni, igazolt allergiás túlérzékenység kizárható.

A segédanyagok vonatkozásában pedig elmondható, hogy elhanyagolhatóan csekély annak az esélye, hogy valaki „igazolással” rendelkezik arról, hogy ő valamelyik segédanyagra allergiás. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a különféle gyógyszerallergiák, például igazolt penicillin-allergia sem jelentenek „felmentést” a Covid-19 elleni vakcina alól, mert a Covid-19 elleni vakcinákban nincs az összetevők között Penicillin.

A következtetés: **elvileg mindenki oltható** (valamelyik oltóanyaggal, és az első oltással).

A második oltásnál már árnyaltabb lesz a kép, hiszen ebben az esetben az első oltás által kiváltott anafilaxiás reakció például már ellenjavallatot jelenthet.

Védőoltások szempontjából az anafilaxiára veszélyeztetettek kisszámú kockázati csoportjába elsődlegesen azok az egyének tartoznak, akik az oltásra alkalmazott vakcina valamelyik komponensére előzetesen már mutattak (főként korábbi oltások kapcsán) orvos által igazolt súlyos allergiás reakciót. Az ilyen egyének oltása ellenjavallt az adott, igazoltan súlyos allergiás reakciót okozó komponenst tartalmazó oltóanyaggal! Ilyen komponenst nem tartalmazó oltóanyaggal azonban ők is különösebb kockázat nélkül olthatók.

- **Polietilénlikol (PEG) allergia esetén mRNS vakcina (Pfizer, Moderna) nem adható.**
- **Poliszorbat allergia esetén nem adható AstraZeneca és Johnson&Johnson vakcina.**

Covid-19 elleni oltóanyag	Ellenjavallatok	Összetétel: hatóanyag + segédanyagok (adagonként)
Moderna	A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.	<p>100 mikrogramm messenger RNS-t (mRNS-t) tartalmaz (SM-102 lipid nanorészecskékbe ágyazva).</p> <p>SM-102 lipid (heptadekán-9-yl 8-{{(2-hidroxietyl)(6-oxo-6-(undeciloxi)hexil)amino}oktanoát)</p> <p>Koleszterin</p> <p>1,2-disztearoil-sn-glicero-3-foszfokolin (DSPC)</p> <p>1,2-dimiriztoil-rac-glicero-3-metoxi-polietilén-glikol-2000 (PEG2000 DMG)</p> <p>Trometamol</p> <p>Trometamol-hidroklorid</p> <p>Ecetsav</p> <p>Nátrium-acetát-trihidrát</p> <p>Szacharóz</p> <p>Injekcióhoz való víz</p>
Pfizer	A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.	<p>30 mikrogramm COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (lipid nanorészecskékbe ágyazva) adagonként (0,3 ml).</p> <p>((4-hidroxietyl)azanedil)bisz(hexán-6,1-dil)bisz(2-hexildekanoát) (ALC-0315)</p> <p>2-((polietilén-glikol)-2000)-N,N-ditetradekilacetamid (ALC-0159)</p> <p>1,2-disztearoil-sn-glicero-3-foszfokolin (DSPC)</p> <p>Koleszterin</p> <p>Kálium-klorid</p> <p>Kálium-dihidrogén-foszfát</p> <p>Nátrium-klorid</p> <p>Dinátrium-hidrogén-foszfát-dihidrát</p> <p>Szacharóz</p> <p>Injekcióhoz való víz</p>

Covid-19 oltóanyag	Ellenjavallatok	Összetétel: hatóanyag + segédanyagok (adagonként)
AstraZeneca	<p>A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.</p> <p>Olyan személyek, akiknél a AstraZeneca beadását követően thrombocytopeniával társuló thrombosis szindróma (TTS) alakult ki.</p> <p>Olyan személyek, akiknél korábban kapilláriszívárgás-szindrómás epizód alakult ki.</p>	<p>SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S) tüske glikoproteint kódoló csimpánz adenovírus, legalább $2,5 \times 10^8$ fertőző egység (Infectious units, Inf.U)</p> <p>L-hisztidin</p> <p>L-hisztidin-hidroklorid-monohidrát</p> <p>Magnézium-klorid-hexahidrát</p> <p>Poliszorbát 80 (E 433)</p> <p>Etanol</p> <p>Szacharóz</p> <p>Nátrium-klorid</p> <p>Dinátrium-edetát (-dihidrát)</p> <p>Injekcióhoz való víz</p>
Johnson & Johnson	<p>A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.</p> <p>Olyan személyek, akiknél korábban kapilláriszívárgás-szindrómás epizód alakult ki.</p>	<p>SARS-CoV-2 tüske-glikoproteint* kódoló, 26-os típusú adenovírus (Ad26.COVS-2), nem kevesebb mint $8,92 \log_{10}$ fertőző egység (Inf.U).</p> <p>2-hidroxi-propil-β-ciklodextrin (HBCD)</p> <p>Citromsav-monohidrát</p> <p>Etanol</p> <p>Sósav</p> <p>Poliszorbát 80</p> <p>Nátrium-klorid</p> <p>Nátrium-hidroxid</p> <p>Trinátrium-citrát-dihidrát</p> <p>Injekcióhoz való víz</p>
Sinopharm	<p>1) A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység, illetve ezzel a vakcinával szemben korábban kialakult túlérzékenységi reakció esetén</p> <p>2) Olyan személyek, akiknél korábban vakcinák alkalmazásakor súlyos mellékhatások jelentkeztek (például akut túlérzékenységi reakció; végtagok, szemek, ajkak, torok duzzanata (angioneurotikus ödéma); légszomj stb.).</p> <p>3) Azon személyeknél, akiknél a krónikus betegség nincs megfelelően egyensúlyban, vagy krónikus betegség akut fellángolása esetén, vagy kórtörténetükben túlérzékenység szerepel.</p> <p>4) Az oltás beadását el kell halasztani, ha a beoltandó személynél láz, vagy</p>	<p>6,5E inaktivált SARS-CoV-2 antigén, 0,225 mg alumínium-hidroxid adjuváns, megfelelő mennyiségű nátrium-klorid, dinátrium-hidrogén-foszfát, nátrium-dihidrogén-foszfát</p>

	egy betegség akut fázisa jelentkezik. 5) Terhes, illetve szoptató nők.	
--	---	--